




Carfentanilo: Un opioide sintético distinto a los demás



En los últimos veinte años, los opioides sintéticos han agravado significativamente la actual epidemia de opioides. Casi el 70 % de las muertes por intoxicación y sobredosis registradas en 2023 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, en particular fentanilo. Entre estas sustancias se encuentra el carfentanilo, que, hasta el momento, se destaca como uno de los análogos del fentanilo más letales. Es un polvo blanco que puede confundirse con fentanilo o cocaína, pero su peligrosidad supera la de casi cualquier otro opioide que circula en las calles.

El carfentanilo es un claro ejemplo de que la epidemia de los opioides no se detiene y suma nuevas amenazas todo el tiempo.

¿Qué es el carfentanilo?

El carfentanilo es un opioide sintético desarrollado originalmente para uso veterinario, pensado para tranquilizar animales de gran tamaño, como los elefantes.

Es una sustancia de una potencia extraordinaria y no está autorizada para uso en humanos. De hecho, se estima que es 10 000 veces más potente que la morfina y 100 veces más fuerte que el fentanilo.

Debido a su potencia extrema, una cantidad mínima y casi invisible de carfentanilo puede causar efectos muy intensos e incluso mortales en el cuerpo humano.

Para aumentar la potencia de otras drogas y maximizar ganancias, el carfentanilo se mezcla con distintas sustancias o en pastillas que simulan analgésicos recetados. Esto aumenta considerablemente el riesgo de sobredosis e intoxicaciones fatales, sobre todo en personas que desconocen que están consumiendo una sustancia tan potente.

Presencia en aumento

La DEA, las autoridades locales y los servicios de emergencia han reportado un crecimiento sostenido de la presencia de carfentanilo en el mercado ilegal de drogas, vinculado a un aumento en las muertes por sobredosis en distintas zonas del país. Según los CDC, las muertes relacionadas con carfentanilo se multiplicaron por siete: pasaron de 29 entre enero y junio de 2023, a 238 en el mismo período de 2024. A la fecha, se ha detectado carfentanilo en 37 estados.

El aumento actual en la presencia de carfentanilo recuerda a picos anteriores registrados entre fines de 2016 y 2017, y nuevamente entre 2019 y 2020. En esos períodos, la DEA registró un fuerte incremento en la cantidad de decomisos relacionados con esta sustancia. Durante esta nueva ola, y solo en lo que va de 2024, los laboratorios de la DEA han analizado más de 100 kilos de carfentanilo mezclado con fentanilo, sustancias afines y otras drogas. Esta cifra supera el total combinado de los tres años anteriores, en los que se incautaron aproximadamente 87 kilogramos de material que contenía carfentanilo.

La mayoría de las incautaciones de carfentanilo registradas en 2024 fueron en forma de pastillas o tabletas, y no en polvo, como solía encontrarse anteriormente. Esta tendencia resulta alarmante debido a lo siguiente:

- **Riesgo elevado de sobredosis:** La potencia extrema del carfentanilo eleva considerablemente el riesgo de sobredosis y muerte, incluso con una sola pastilla.
- **Apariencia engañosa:** En el último año, se ha incrementado el uso de carfentanilo en pastillas que imitan medicamentos recetados, lo que ha llevado a muchas personas a consumirlo sin saber que se trata de una sustancia mucho más potente.

Sobredosis y dificultades en el tratamiento

La exposición al carfentanilo puede provocar depresión o paro respiratorio, somnolencia, desorientación, sedación, pupilas contraídas y piel fría y húmeda. La aparición de estos síntomas suele ocurrir pocos minutos después de la exposición. Su efecto inmediato sobre el sistema nervioso central deja muy poco margen para aplicar intervenciones que salven la vida.

Tratar una sobredosis relacionada con carfentanilo es sumamente difícil. Si bien la naloxona se utiliza ampliamente como antídoto de emergencia ante sobredosis por opioides, en dosis habituales puede no ser eficaz contra el carfentanilo. En muchos casos, se requiere administrar varias dosis elevadas, y aun así no se asegura que se logre revertir sus efectos.

Concientización y prevención

Concientizar a la población es fundamental para prevenir las sobredosis y las intoxicaciones por opioides sintéticos. Toda persona en contacto con drogas ilícitas, incluidas pastillas falsas o polvos, debe estar consciente del riesgo de que contengan carfentanilo.

Informar a la sociedad y generar conciencia es esencial para contrarrestar las consecuencias devastadoras de opioides sintéticos como el carfentanilo.

Recuerden que Una pastilla puede matar. Para protegerse:

- **Evitar las drogas ilegales y las pastillas falsificadas:** No consuman sustancias ilícitas, ya que podrían contener carfentanilo sin que lo sepan. Nunca se debe tomar una pastilla que no haya sido recetada por un médico y entregada por un farmacéutico autorizado.
- **Pedir ayuda:** Si se sospecha que una persona estuvo expuesta al carfentanilo o presenta síntomas de sobredosis, se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia y administrar naloxona, si está disponible.
- **Mantenerse informado:** Es importante conocer los riesgos del carfentanilo y educar a las personas cercanas sobre los peligros de los opioides sintéticos.

